




**HIV**  
**AIDS**

**Portugal**

**Henrique Barros**




# Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida - Portugal






## AIDS number of cases – Portugal






## AIDS cases, by gender and age – Portugal





## AIDS deaths, by gender – Portugal






## AIDS deaths - trend, by year and gender - Portugal

year	Total		Males		Females	
	n	%	n	%	n	%
1988	62	-	55	-	7	-
1989	114	83,9	96	74,5	18	157,1
1990	153	34,2	135	40,6	18	-
1991	240	56,9	207	53,3	33	83,3
1992	375	56,3	325	57,0	50	51,5
1993	441	17,6	376	15,7	65	30,0
1994	650	47,4	552	46,8	98	50,8
1995	949	46,0	802	45,3	147	50,0
1996	1 111	17,1	919	14,6	192	30,6
1997	972	-12,5	815	-11,3	157	-18,2
1998	895	-7,9	724	-11,2	171	8,9
1999	980	9,5	797	10,1	183	7,0
2000	951	-3,0	777	-2,5	174	-4,9
2001	1 026	7,9	863	11,1	163	-6,3
2002	943	-8,1	781	-9,5	162	-0,6




## AIDS deaths per 100,000 , by region – Portugal






## AIDS cases, by mode of transmission and year of diagnosis – Portugal







## AIDS cases, by mode of transmission and year of diagnosis – Portugal





## Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis

Vigilância Epidemiológica da Infecção pelo VIH  
Folha de Notificação (ver instruções no verso, s.f.f.)

N.º

/ SIDA

\*

\* A preencher pelo CVEDT



Ministério da Saúde

### 1. tipo / classificação

SIDA <input type="checkbox"/>	CDC*		A	B	C
CRS-LGP <input type="checkbox"/>		1			
PA <input type="checkbox"/>		2			
		3			

\* Se também disponível

### 2. datas

Ano provável de infecção \_\_\_\_\_

Notificação aa/mm/dd Diagnóstico aa/mm/dd

1.ºs Sintomas aa/mm/dd Falecimento aa/mm/dd

### 3. dados de codificação

Último apelido (3 prim.ºs consoantes) \_\_\_\_\_

Primeiro nome próprio (2 prim.ºs consoantes) \_\_\_\_\_

Sexo (M/F) \_\_\_\_\_ Data de nasc. aa/mm/dd Idade \_\_\_\_\_

Naturalidade \_\_\_\_\_

Nacionalidade \_\_\_\_\_

### 4. residência

Distrito \_\_\_\_\_ Concelho \_\_\_\_\_

País de resid.ª no provável contágio \_\_\_\_\_

País de resid.ª nos 1.ºs sintomas \_\_\_\_\_

### 5. motivo

Motivo da consulta/internamento ou do teste \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 9. Características do parceiro no contacto heterossexual

Desconhecido  Hemofílico

HIV 1 positivo  HIV 2 positivo

Homem Bissexual

Originário/residente de país estrang. Qual? \_\_\_\_\_

Trab. sexo  Toxicodependente IV

Transfundido  Nenhum dos grupos mencionados

### 10. doenças indicadoras de SIDA

1. Doença \_\_\_\_\_

Método de diagnóstico \_\_\_\_\_

Data aa/mm/dd Serviço \_\_\_\_\_

2. Doença \_\_\_\_\_

Método de diagnóstico \_\_\_\_\_

Data aa/mm/dd Serviço \_\_\_\_\_

3. Doença \_\_\_\_\_

Método de diagnóstico \_\_\_\_\_

Data aa/mm/dd Serviço \_\_\_\_\_

4. Doença \_\_\_\_\_

Método de diagnóstico \_\_\_\_\_


Data aa/mm/dd Serviço \_\_\_\_\_

### 11. serologia VIH

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Data 1.º teste VIH+ \_\_\_\_\_



## Condom use by 15-19 years-old students – Portugal





## Reasons for non-consistent condom use (%)



Don't no know how to use it	1.1	5.1
Ashamed to buy it	5.6	9.3
Decreases sexual pleasure	28.3	66.5
It's using another contraceptive	49.6	14.2
Decreases partner confidence	3.2	3.6
Being faithful	22.4	20.7
Surely the partner is faithful	29.9	20.9
Not used to condoms since the beginning	10.7	12.0



## **HIV IN PREGNANCY: PORTUGUESE TESTING POLICIES & PRACTICES**

1998 – Part of pre-conception counselling

2002 – Added to prenatal care



**Antes de pensar na **COR****



**faça o teste da SIDA.**



1st test until 14th gestational week

Repeat at 32 weeks

---

1st test after 14th gestational week

Repeat at 32 weeks


---

No testing during pregnancy or no information at labour

Rapid HIV Test




## Survey of Portuguese Hospitals – Proportion of women with no HIV test at delivery - 2005








## Survey of Portuguese Hospitals – Proportion of women with no HIV test at delivery - 2005





## Survey of Portuguese Hospitals – Proportion of women with no HIV test at delivery, by education (years) - 2005





	Deliveries (n)	HIV-positive Mothers (n)	Prevalence %
North	30172	52	0.17
Center	15026	25	0.18
South	25759	191	0.74
<b>Total</b>	<b>70957</b>	<b>268</b>	<b>0.38</b>

Portugal, 2003 – 60% deliveries (non-random sample)


HIV - positive women: 43% identified during pregnancy, 5% at delivery



	Deliveries (n)	HIV-positive Mothers (n)	Prevalence
2003	49189	181	0,37%
2004	51185	179	0,35%
2005	56071	136	0,24%

Portugal 2003-2005, same set of public hospitals

# AIDS DEFINING CONDITIONS AMONG IDU



**N = 6 181**


<b>CADs: 2004</b>	<b>Testes</b>	<b>Positivos n (%)</b>	<b>Não reclamados VIH+</b>	<b>Não reclamados Neg.</b>
Aveiro	247	6 (2,4)	1	19
Beja	26	1 (3,8)	0	0
Braga	280	4 (1,4)	0	0
Bragança	95	0	0	18
Castelo B	68	0	0	6
Coimbra	313	3 (1,0)	0	47
Évora	92	1 (1,1)	0	13
Faro	571	4 (0,7)	3	50
Faro (m)	372	0	0	52
Guarda	23	0	0	3
Leiria	175	4 (2,3)	1	17
Lisboa-F	1159	30 (2,6)	0	0
Lisboa-L	2614	49 (1,9)	11	54
Lisboa -m	1071	18 (1,7)	2	0
Porto	1200	26 (2,2)	7	63
Portalegre	18	0	0	0
Santarém	102	3 (2,9)	0	6
Setubal	247	4 (1,6)	0	
vila real	96	0	0	0
Viana	13	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8782</b>	<b>153 (1,7)</b>	<b>25</b>	<b>348</b>

## Infeção por VIH-2

**4% em 3842 casos**


**(Porto - período 1983-  
2002)**

# Canábis 2001 – Idades 17-18 anos Portugal, França







## Consumo recente (último ano) de cocaína entre jovens adultos (15-34 anos)



# Estimates of injecting drug use in EU Member States (most recent one-year prevalence per 1 000 inhabitants aged 15–64)



## Prevalence of HIV infection among IDUs in the EU Member States and Norway




Informe-se

[www.sida.pt](http://www.sida.pt)


☎ Linha SIDA 800 266 666

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE  
Coordenação Nacional para a Prevenção de SIDA




Só há  
uma maneira  
de saber.

Faça o teste VIH/SIDA.



# Cronograma



# Expositor de Material IEC em *setting* CAT



# Brochura de sensibilização para a redução de riscos e minimização de danos

**ivo**







# Manual de Boas Práticas



Manual de Boas Práticas - frente - formato 200x110 mm



Manual de Boas Práticas - verso



Manual de Boas Práticas - paginação Interior



### Considera-se uma pessoa informada?

O vírus da sida transmite-se:

Através de relações sexuais não protegidas (sem preservativo).

Através de partilha de material contaminado de injeção de drogas (seringas, agulhas, algodões, baldos) e de instrumentos cortantes (ex. lâminas de barbear).

Da mãe infectada para o seu bebé.

### Fazer o teste VIH/sida, porque?

Decidir fazer o teste VIH/sida não é fácil, mas pode salvar a sua vida. A infeção VIH/Sida não tem cura, mas tem tratamento.

Se está em risco de estar infectado/a, porque teve comportamentos de risco, deve de pensar em si e nos outros.

O teste é gratuito e o resultado é confidencial.

O teste apenas detecta a infeção passadas 7 a 8 semanas após a situação de risco.

O teste é um direito seu, mas ninguém o pode obrigar a fazê-lo.

### E depois do teste

Você é quem decide com quem partilhar o resultado.

Se o resultado for negativo, desfaz a dúvida com que viveu, mas é fundamental proteger-se sempre de novas situações de risco.

Se o resultado for positivo, a infeção VIH/Sida tem tratamento. O tratamento é gratuito e é definido em consultas de especialidade nos hospitais.

Informe-se corretamente, contacte o seu técnico de referência e terá o apoio e o aconselhamento adequados.

Só há  
uma maneira  
de saber.

Faça o teste VIH/Sida.

Faça o teste  
VIH/Sida.



Se há um médico de família

Cartão  
Referência  
Hospitalar

Cartão  
Referência  
Hospitalar

CAT  Telefone

Médico Assistente CAT

Ponto Focal CAT  Telefone

Data de Teste

Observações

Hospital

Serviço

Morada

Médico de referência

Ponto Focal  Telefone

Data UM  Hora


Data DM  Hora

Cartão  
Referência  
Hospitalar



Cartão  
Referência  
Hospitalar

Informa-te

[www.drogas.pt](http://www.drogas.pt)  
[www.acs.min-saude.pt](http://www.acs.min-saude.pt)

 Linhas de Apoio  
800 266 666  
1414 (gratuitas)

# Teste Rápido




## Resultado Negativo




Controlo

Câmara

## Resultado Positivo



VIH1 +



VIH2 +

**Os testes não devem ser interpretados após 20 minutos**